



Standards für präoperative Erhebung einer Gerinnungs- Anamnese bei Kindern
Empfehlungen der Arbeitsgruppe perioperative Gerinnung (AGPG)
der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie,
Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI)

Fragebogen zur präoperativen Erhebung einer Gerinnungsanamnese bei Kindern

1. Beobachten Sie bei Ihrem Kind folgende Blutungsarten, auch ohne erkennbaren Grund?

a) vermehrtes Nasenbluten

nein

ja

immer

saisonal?

gehäuft bei Einnahme von Schmerzmitteln

b) vermehrt „blaue Flecken“ (auch am Körperstamm oder an anderen für Sie „ungewöhnlichen“ Stellen)

nein

ja

sportliche Exposition

bei Kindern: sehr „stürmisch“

ohne jeglichen Zusammenhang mit „Anstoßen, Zwicken, etc.)

immer schon oder ab wann?

gehäuft bei Einnahme von Schmerzmitteln

c) Zahnfleischbluten

nein

ja

Zahnfleischstatus?

Nur „rote Zahnbürste“

echtes
Zahnfleischbluten

2. Beobachten Sie bei Schnittwunden längeres Nachbluten?

nein

ja

Wie lange genau? Welche Verletzung?

v. a. nach Einnahme von Schmerzmitteln?

3. Gab es in der Vorgeschichte eine längere/verstärkte Blutung während oder nach Operationen?

nein

ja

Welche Operationen?

War die Blutung tatsächlich über der Norm (MSBOS)

nein

ja



4. **Gab es in der Vorgeschichte eine Wundheilungsstörung?** nein
 ja lange nässend, lange „klaffend“ Neigung zum „Vereitern“
im Vergleich mit anderen Personen deutlich verzögerte Wundheilung nein ja

5. **Gab es in der Vorgeschichte längeres/verstärktes Nachbluten beim Zahndurchtritt oder beim Zahnziehen?**
 nein
 ja Wie lange? War eine Nachbehandlung nötig? nein ja
Trat es nur nach der Einnahme von Schmerzmitteln auf? nein ja

6. **Gab/gibt es in der Blutsverwandtschaft Fälle von Blutungsneigung?** nein
 ja Angabe des Verwandtschaftsgrades
Ist die genaue Diagnose bekannt? nein ja

7. **Hat Ihr Kind in den letzten Tagen eines der folgenden Medikamente eingenommen?**
Aspro®, Aspirin®, Voltaren, Proxen-Saft®, Nureflex® nein ja
Genauere Angabe der Medikamente
Beobachten Sie eine Blutungsneigung (oder eine Zunahme der Blutungsneigung) seit die Medikamente eingenommen werden? nein ja
Konnte man vor Einnahme der Medikamene keinerlei auffällige Blutungsneigung beobachten? nein ja

Unterschrift:

Arzt:

Erziehungsberechtigte/r: